

Neue Nitidulidae des Museo Civico di Storia Naturale, beschrieben von EDMUND REITTER, in Wien.

## II Serie.

### 1. *Ithyphenes cucujiformis* Rtrr.

*Valde elongatus, parallelus depressus, nitidus, piceo-brunneus, antennis pedibusque parum dilutioribus, capite antice sensim, mandibulis totis elytrisque dimidio postico nigris; capite subtransverso, glabro, margine basali punctato, punctis oblongis, subrugosis, epistomate porrecto, utrinque sinuato, medio producto, trisinuato, fronte apice sulco profunde impresso brevi, intus abbreviata, extus excurrente; prothorace capite haud latiore, latitudine fere aequilongo, antice subparallelo, apicem versus rotundatim angustato, angulis posticis rotundatis, anticis obtusis, margine antice subbisinuato, basali rotundato, dorso linea longitudinali media, antico et apice parum abbreviata levius insculpta, utrinque longitudinaliter leviterque depressa, impressionibus parce subtiliter indeterminate punctatis; scutello haud punctato; elytris basi thorace haud, apicem versus parum latioribus et sesqui longioribus, substriatis, striis distincte punctatis, interstitio primo prope scutellum latiore, parce irregulariter punctato, angulis apicalibus exterioribus rotundatis; abdomine segmentis dorsalibus utrinque distincte, dense punctatis, medio sublucis aut dense subtilissime punctulatis, segmento anali apice late producto, lobo in medio leviter emarginato et fulvo villosa; abdominis segmentis ventralibus dense, ultimo sensim confertim punctatis, hoc apice fulvo ciliato, margine apicali in medio triangulariter producto. — Long. 16, lat. 3 mill.*

*Nova Guinea (Fly River). L. M. D'Albertis 1876-77.*

Von der Grösse und Form des *I. Gestroi* Rtrr. Dunkler gefärbt, das Halsschild länger, die Flügeldecken mit deutlichen Punktstreifen, das Analsegment des ♀ an der Spitze stärker lappenförmig ausgezogen und die Bildung der Stirn ist eine an-

dere. Die Stirn ist am Vorderrande in der Mitte vorgezogen, jederseits gebuchtet, der mittlere Theil mit 3 Ausrandungen, wovon die seitlichen seicht und klein, die mittlere grösser und tiefer ist und in welche die kurze Stirnfurche einmündet. Kopf auf der Unterseite vor den Augen, am Innenrande der Fühlerfurche mit einem sehr dünnen Haarpinsel.

Das vorliegende Stück dieses interessanten Käfers scheint ein ♀ zu sein.

Von *Ithyphenes Gestroi* Rtrr. ist mir bisher nur das ♂ bekannt gewesen; nun liegt mir auch das ♀ vor. Bei diesem ist der Haarpinsel auf der Hinterseite des Kopfes vor den Augen viel feiner, nur aus wenigen Haaren gebildet, der 5. Bauchring an der Spitze in der Mitte leicht und breit ausgerandet; das vortretende Pygidium an der Spitze kurz bedornt und lang gelb behaart, fast gerade abgestutzt.

## 2. *Haptoncus Albertisi* Rtrr.

*Testaceus, subtilissime breviterque fulvo-puberulus, prothorace transverso, longitudine in ♂ fere duplo, in ♀ plus quam duplo latiore, sat dense subtilissime punctato, margine apicali basali que fere recte truncatis, lateribus a medio ad basin subparallelo, ad apicem angustato, tenuissime marginato reflexo, scutello minus perspicue punctulato, elytris thorace haud latioribus, duplo longioribus, confertim subtilissime punctulatis, apice parum oblique truncatis, lateribus tenuissime reflexo-marginatis, subparallelis aut antice et postice aequaliter angustatis. — Long. 2.3-2.5 mill.*

♂ *Tibiis posticis paululum curvatis, intus a medio ad apicem parum dilatatis, segmento dorsali sexto minuto conspicuo.*

♀ *Tibiis simplicibus.*

*Nova Guinea (Insula Yule). L. M. D'Albertis, Juni 1875.*

Von *concolor* durch die schmal abgesetzten Seiten des Halsschildes und wie auch von *ovalis* Murray durch doppelt grössere Körperform abweichend; von *pubescens* Mur. und *testaceus* Mur. durch das von der Mitte zur Basis nicht verengte Halsschild verschieden.

*Hapt. mundus* Sharp. ist mir zwar unbekannt, soll aber

weitläufig punctirt sein und dürfte mit meinem *remotus* von Mulmein zusammenfallen.

### 3. *Haptoncura liliputiana* Rtrr.

*Parvula, testacea, subpubescens, subtilissime confertim, elytris obsolete punctulata, prothorace longitudine plus quam duplo latiore, subparallelo, margine antice basique fere truncato, lateribus angustissime reflexo-marginatis, subrectis aut in medio levissime subrotundatis, angulis posticis rectis, acutis, anticis vix prominulis; elytris thorace duplo longioribus et haud latioribus, subparallelis, apice fere recte truncatis. — Long. 1.3 mill.*

Australien (Somerset) L. M. D'Albertis, Januar 1878.

Die kleinste einfarbig gelbe Art; *minuta* Rtrr. von Java ist etwas grösser; noch grösser und kürzer ist *subquadrata* Rtrr. vom Cap York; beide haben aber einen breit abgesetzten Seitenrand des Halsschildes.

### 4. *Ischaena interstitialis* Rtrr.

*Elongata, apicem versus parvulum angustata, nigro-fusca, antennis tarsisque dilutioribus, capite subtransverso, crebre punctato, inter antennis biimpresso; prothorace capite latiore, subquadrato, sat fortiter lateribus fortissime, longitudinaliter rugose punctato, parce brevissime subsetuloso, margine antice late emarginato, basali et lateribus marginatis, hoc leviter aequaliterque retundato, angulis anticis acutis productis, posticis subrectis, ante basin prope angulis posticis plica tenuissima elongata magis elevata; scutello minuto, breviter triangulari, glabro; elytris thorace latitudine aequalibus, apicem versus angustatis, subopacis, leviter striatis, striis in fundo subtiliter punctatis et alternis breviter albido aut fulvo-setulosis, interstitio inter striis 2.<sup>o</sup> et suturali antice latiore, parce irregulariter punctato, humeris subacutis, prominulis. — Long. 5.5-8 mill.*

Nova Guinea (Fly River). L. M. D'Albertis 1876-77.

Von *longiceps* Rtrr. durch kürzeren Kopf etc, von *angustata* Er., und *elongata* Er. durch feinere Punktstreifen der Flügeldecken, wovon der erste Zwischenraum an der Basis breiter und irregular punktiert ist, verschieden.

5. *Lasiodactylus Albertisi* Rtttr.

*Oblongo-ovatus, nitidulus, subdepressus, tenuiter breviterque fulvo pubescens, fusco-testaceus aut sordide ferrugineus, dense subtiliter asperato-punctatus, capite inter antennis biimpresso; prothorace transverso, longitudine plus quam duplo latiore, margine antice late emarginato, basali leviter bisinuato, lateribus rotundato, antice angustato, angulis parum productis, rectis, obtusiusculis; scutello triangulare, dense subtiliter simpliciterque punctato; elytris thorace haud latioribus et triplo longioribus, apicem versus angustatis, apice obtuse rotundatis, prope suturam parum magis rotundato-productis; dorso dense sulcatis, sulcis crebre seriatim punctatis et brevissime puberulis, interstitiis angustis, carinato-elevatis, carinis dense seriatim subtiliter punctulatis et seriatim pubescentibus, pube magis perspicua, depressa; carinis apice sensim obsolete, carinula secunda apice vix, quinta longe ante apicem abbreviata; lateribus late explanatis ferrugineis, dorso infuscato, macula magna basali triangulari et secunda communi minore transversa paulo pone medium sita exceptis; pedibus in utroque sexu simplicibus, brevibus, tibiis robustis, carinatis. — Long. 5-6 mill.*

♂. *Pygidio apice emarginato.*

♀. *Pygidio apice subrotundato, puberulo.*

*Australia (Somerset). L. M. D'Albertis, Januar 1875.*

Diese Art ist sehr ausgezeichnet durch die Sculptur der Flügeldecken. Diese sind schmutzig rostroth oder braungelb, die Scheibe angedunkelt, ein grosser dreieckiger gemeinschaftlicher Flecken an der Basis, welcher die ganze Basis einnimmt, dann eine kleine gemeinschaftliche quere Mackel über die Naht dicht unter der Mitte von der dunkleren Färbung ausgeschlossen; häufig sind in dem dreieckigen Basalflecken noch einige dunkle Mackeln vorhanden. Die Scheibe ist dicht gefurcht, die Furchen dicht und stark punctirt, äusserst fein und kurz in einer Reihe behaart; die Zwischenräume sehr schmal, kielförmig erhaben, vor der Spitze abgekürzt, nur der zweite von der Naht erreicht fast völlig dieselbe, der fünfte ist der kürzeste, weit vor der Spitze abgebrochen, die Rippen oben mit einer dichten und feinen Punktreihe, jeder Punkt mit einem längeren, niedergebogenen Härchen versehen.

### 6. *Circopes adelopiformis* Rtrr.

*Parvulus, breviter ovatus, convexus, brunneo-testaceus, subтус cum antennis pedibusque dilutioribus, capite prothoraceque parce subtilissime punctulatis, tenuiter fulvo-pubescent, hoc transverso, ampliato, lateribus antrorsum rotundatim angustato, subrecto; scutello sat magno, obtuse triangulari, vix punctato, apice parce puberulo; elytris thorace vix duplo longioribus et fere paululum angustioribus, apicem versus minus angustatis, lateribus subrectis, dorso subtilissime seriatim punctulatis et seriatim pilosulis, pilis depressis brevibus, in striis alternis magis conspicuis. — Long. 1-1.3 mill.*

*Australia (Somerset). L. M. D'Albertis, Januar 1875.*

Viel kleiner als *C. subquadratus* Motsch. von Ceylon, aber ihm sehr ähnlich; während jedoch bei dem letzteren jede dritte Haarreihe auf den Flügeldecken etwas länger ist, ist bei *adelopiformis* jede zweite deutlicher.

### 7. *Amphicrossus simplex* Rtrr.

*Subtus cum antennis pedibusque fusco-ferrugineus, supra fuscus, aequaliter sat dense punctatus, breviter fulvo-pubescent, pilis parum longioribus in elytris subseriatim dispositis intermixtis. — Long. fere 6 mill.*

*MAS. Fasciculo suturali nullo; abdominis segmento 5.º ventrali apice leviter emarginato, in medio lobo minuto, triangulari, apice truncato, producto.*

*FEM. Abdominis segmento 5.º ventrali simplice.*

*Australia (Somerset). Januar 1875, L. M. D'Albertis.*

Dem *A. discolor* Er. sehr ähnlich, aber grösser, mit deutlich längeren Flügeldecken; dem ♂ fehlt der Haarpinsel auf den Flügeldecken in der Nähe der Nath und das 5. Bauchsegment zeigt in der Mitte eine kleine dreieckige an der Spitze abgestützte Hervorragung, welche bei der verglichenen Art fast quadratisch geformt ist.

### 8. *Amphicrossus subopacus* Rtrr.

*Oblongo-ovalis, subtus cum antennis pedibusque fusco-ferrugineus,*

*supra fuscus, subopacus, dense aequaliterque punctatus, dense subtiliter fulvo-pubescent, pilis parum longioribus, in elytris subseriatim dispositis, intermixtis. — Long. 6.5 mill.*

MAS. Fasciculo suturali nullo; abdominis segmento 5.<sup>o</sup> apice leviter emarginato in medio lobo subquadrato minuto producto.

Australia (Somerset). L. M. D'Albertis, Januar 1875.

Ebenfalls dem *discolor* Er., sehr ähnlich, mit gleicher Geschlechtsauszeichnung am Hinterrande des fünften Bauchringes, aber den Haarpinsel auf den Flügeldecken neben der Naht fehlt ebenfalls, ist keineswegs abgerichen. Diese neue Art ist durch ansehnliche Grösse und matte Oberfläche welche dichter gelblich behaart ist, recht ausgezeichnet. Auf dem Halsschilde ist die Behaarung in verschiedener Richtung gewendet.

### 9. *Strongylus ruficeps* Rtrr.

*Subhemisphaericus, niger, nitidus, elytris subviridi-micans, capite, prothoracis lateribus, pygidio, subtus cum antennis (clava subinfuscata excepta) pedibusque rufis; capite prothorace dense subtiliter punctulato; elytris obsolete subseriatim punctulatis, interstitiis latis, parce, lateribus dense subtilissime punctatis, apice singulariter rotundatis, humeris rectis; pygidio sat fortiter punctato. — Long. 3.8-4.5 mill.*

Nova Guinea (Insula Yule). L. M. D'Albertis, Juni 1875.

Ganz lebhaft roth gefärbt, das Halsschild bis auf die Seiten schwarz; die Flügeldecken schwarz mit schwach grünlichem Scheine. Eine durch die Färbung bereits sehr kenntliche Art. Das Pygidium wird zum grössten Theile von den Flügeldecken nicht bedeckt.

### 10. *Ancyrona Gestroi* Rtrr.

*Lato-ovalis, depressa, fusco-ferruginea, minus dense breviterque griseo- aut fulvo-pubescent, corpore lateribus late explanatis antennisque dilutionibus, subtus cum pedibus testaceis; capite sat dense, prothorace parce sat fortiter sed minus profunde punctatis; hoc latissimo, angulis anticis antrosum productis, posticis subrotundatis; scutello semirotondato, parce punctulato; elytris thorace basi*

*haud latioribus fere quadruplo longioribus, subparallelis, apice conjunctim rotundatis, dorso dense punctato-striatis, striis approximatis, interstitiis angustis, alternis paullo magis elevatis. — Long. 5-7 mill.*

*Australia (Somerset); Nova Guinea (Insula Yule). L. M. D'Albertis.*

Der *A. lanuginosa* Motsch., von Ceylon ähnlich, aber viel kürzer behaart, das Halsschild weilläufiger punktiert, die abwechselnden Zwischenräume der Punktstreifen weniger deutlich erhaben und besonders durch die breiter abgesetzten Seiten des Körpers weit verschieden.

---